


CORONAVÍRUS

(COVID-19)

Fluxo de Atendimento à Gestantes

GESTANTE CHEGA À UAPS



Máscara cirúrgica, gorro e luvas de procedimento

TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO ACOLHIMENTO
Atender paciente com síndrome gripal por influenza/Covid-19, com parametração adequada e colocar máscara cirúrgica no paciente

Febre ou pelo menos um dos sinais ou sintomas respiratórios: tosse, dificuldade de respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, coriza, $\text{SatO}_2 < 95\%$, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia.

*CONTATO PRÓXIMO = Estar a 2 metros de um paciente suspeito, por um período prolongado, sem uso de EPI's.

SÍNDROME GRIPAL LEVE

SÍNDROME GRIPAL GRAVE

MÉDICO/ENFERMEIRO DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
Paramentar-se com máscara cirúrgica, avental descartável, óculos, gorro, luvas de procedimento.

MÉDICO/ENFERMEIRO DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
Paramentar-se com máscara N95, avental impermeável, óculos, gorro, luvas de procedimento. Encaminhar para estabilização, comunicar ao obstetra/Clinico e Anestesiologista.

Levar, se possível, para uma sala isolada.

A paciente deve permanecer com máscara cirúrgica.

Se houver procedimentos o profissional tem que estar protegido com avental impermeável, protetor facial, gorro, luvas, NF95.

Prescrever - Oseltamivir 75 mg.
01 comprimido, 12h/12h, por 5 dias

Indicação de procedimento cirúrgico de urgência? (ex. Parto, Laparotomia).

Não

Sim

ENFERMEIRO/MÉDICO DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
- Orientar paciente quanto aos cuidados e sinais de alertas e encaminhar para casa.

ENFERMEIRO DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
Seguir fluxo de atendimento obstétrico/ginecológico habitual

MÉDICO - Paramentar-se com máscara N95, avental impermeável, óculos, gorro, luvas de procedimento. Se procedimento com possibilidade de gerar aerossóis, utilizar KIT

Prescrever - Oseltamivir 75 mg. 01 comprimido, 12h/12h, por 5 dias

Internar paciente - Solicitar coleta de amostra para laboratório

Conduta obstétrica individualizada após avaliação materno e fetal.

CRITÉRIOS

- FR ≥ 20 rpm
- Sat O₂ $< 95\%$
- Febre por mais de 3 dias
- Confusão mental, Sonolência ou letargia
- PAS < 90 mmHg
- PAD < 60 mmHg

Ex. do uso do KIT:

- Intubação traqueal
- Aspiração traqueal
- Ressuscitação cárdio pulmonar
- Ventilação não invasiva
- ventilação manual

 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

 ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ

 SOCEGO
Associação Cearense de Ginecologia e Obstetria